

Adjunto 1

Lista de especies de aves que pertenecen a las familias y géneros agregadas actualmente en el Apéndice II, cumplen los criterios de la CMS y tienen un estado de conservación desfavorable.

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Anatidae	Ansar Emperador	<i>Anser canagicus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Anatidae	Pato havelda	<i>Clangula hyemalis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Anatidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Anatidae	Éider de anteojos	<i>Somateria fischeri</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Anatidae	Eider común	<i>Somateria mollissima</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Anatidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Anatidae	Negrón especulado	<i>Melanitta fusca</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Anatidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Anatidae	Negrón americano	<i>Melanitta americana</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Anatidae	Serreta china	<i>Mergus squamatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Anatidae	Ganso del Orinoco	<i>Neochen jubata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente de 100 a 1.000 km, pero en una dirección no uniforme. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Anatidae	Pato Almirante Aliblanco	<i>Asarcornis scutulata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Sedentarios/residentes: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen recorrer menos de 100 km, pero en una dirección no uniforme. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN
Anatidae	Porrón europeo	<i>Aythya ferina</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Anatidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Anatidae	Ánade anteojo	<i>Specularis specularis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión sustancial del área de distribución post-reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Anatidae	Cerceta de Alfanjes	<i>Mareca falcata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Anatidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Phoenicopteridae	Flamenco Chileno	<i>Phoenicopus chilensis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Phoenicopteridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución post-reproducción y moderadamente nómada tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos viajan comúnmente >1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Phoenicopteridae	Flamenco Enano	<i>Phoeniconaias minor</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Phoenicopteridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Sedentarios/residentes, pero fuertemente nómadas tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos viajan comúnmente más de 1.000 km, pero sin una dirección consistente. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Gruidae	Grulla sarus	<i>Antigone antigone</i>	Un miembro de un género agregado, Antígona. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente de 100 a 1.000 km, pero sin una dirección consistente; la subpoblación australiana no migra a través de las fronteras internacionales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Gruidae	Grulla Americana	<i>Grus americana</i>	Un miembro de un género desagregado, <i>Grus</i> . Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN
Pluvianellidae	Chorlito de Magallanes	<i>Pluvianellus socialis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Pluvianellidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión sustancial del área de distribución post-reproducción, con lugares de reproducción ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Haematopodidae	Ostrero euroasiático	<i>Haematopus ostralegus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Haematopodidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Charadriidae	Chorlito cordillerano	<i>Phegornis mitchellii</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Charadriidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Charadriidae	Chorlitejo silbador	<i>Charadrius melodus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Charadriidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Charadriidae	Chorlitejo cariblanco	<i>Charadrius dealbatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Charadriidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	DD
Charadriidae	Chorlitejo nivoso	<i>Charadrius nivosus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Charadriidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción: los lugares de reproducción están ocupados de manera fiable cada temporada, pero son moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; al menos una subpoblación está separada de la ruta de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Charadriidae	Chorlitejo pálido	<i>Charadrius pallidus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Charadriidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución post-reproducción y moderadamente nómada tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Charadriidae	Chorlito llanero	<i>Charadrius montanus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Charadriidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; al menos una subpoblación separada de la ruta de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Charadriidae	Avefría europea	<i>Vanellus vanellus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Charadriidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero son moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopaciidae	Zarapito americano	<i>Numenius arquata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Scolopaciidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Scolopacidae	Aguja colipinta	<i>Limosa lapponica</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Scolopacidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopacidae	Aguja colinegra	<i>Limosa limosa</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Scolopacidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopacidae	Correlimos zarapitín	<i>Calidris ferruginea</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Scolopacidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopacidae	Correlimos cuellirrojo	<i>Calidris ruficollis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Scolopacidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Scolopacidae	Agujeta asiática	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Scolopacidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopacidae	Agachadiza fueguina	<i>Gallinago stricklandii</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Scolopacidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; al menos una subpoblación separada de la ruta de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Scolopacidae	Agachadiza del Himalaya	<i>Gallinago nemoricola</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Scolopacidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Scolopacidae	Agachadiza real	<i>Gallinago media</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Scolopacidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Scolopacidae	Playero siberiano	<i>Tringa brevipes</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Scolopacidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable todas las estaciones, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Sedentarios/residentes: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los inmaduros pueden migrar más allá del rango normal de los adultos antes de regresar a la reproducción. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Águila volatinera	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Accipitridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio en el área de distribución posterior a la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; los inmaduros pueden migrar más allá del área de distribución normal de los adultos antes de regresar a la reproducción; al menos una subpoblación separada de la vía de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Accipitridae	Culebrera sudanesa	<i>Circaetus beaudouini</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Accipitridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero son moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Accipitridae	Culebrera barrada	<i>Circaetus fasciolatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Accipitridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión del área de distribución post-reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Buitre del Himalaya	<i>Gyps himalayensis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio en el área de distribución posterior a la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen recorrer menos de 100 km pero en una dirección no uniforme; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales; los inmaduros pueden migrar más allá del área de distribución normal de los adultos antes de regresar a la reproducción. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Accipitridae	Buitre Negro	<i>Aegypius monachus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución post-reproducción y expansión sustancial y moderadamente nómada tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; al menos una subpoblación separada de la vía de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Águila rapaz	<i>Aquila rapax</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio del área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; al menos una subpoblación separada de la ruta de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Accipitridae	Aguilucho Negro	<i>Circus maurus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción: los lugares de reproducción están ocupados de manera fiable todas las estaciones, pero son moderadamente nómadas en las estaciones no reproductoras; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; a veces hay irrupciones más allá del área de distribución normal en números significativos; al menos una subpoblación está separada de la ruta de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Accipitridae	Aguilucho Papialbo	<i>Circus macrourus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Azor Pechigrís	<i>Accipiter poliogaster</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Accipitridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Pigarguillo Menor	<i>Icthyophaga humilis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Accipitridae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución post-reproducción con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente de 100 a 1.000 km pero en una dirección no consistente; al menos algunos movimientos principalmente altitudinales; al menos una subpoblación separada de la vía de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Accipitridae	Milano Real	<i>Milvus milvus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Accipitridae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Falconidae	Caracara Austral	<i>Phalcoboenus australis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Falconidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar de 100 a 1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Falconidae	Alcotán turumti	<i>Falco chicquera</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Falconidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio de área de distribución post-reproducción y moderadamente nómada tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km pero en una dirección no consistente; al menos una subpoblación separada de la vía de migración considerada sedentaria. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Falconidae	Halcón pizarroso	<i>Falco concolor</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II de la CMS. (Falconidae). Aunque actualmente está inscrita en la base de datos del Apéndice II como especie, no está oficialmente inscrita. Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Oriolidae	Oropéndola plateada	<i>Oriolus mellianus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Oriolidae, anteriormente Muscipidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Vireonidae	Vireo cabecinegro	<i>Vireo atricapilla</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Vireonidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Monarchidae	Monarca japonés	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Monarchidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Chaetopidae	Saltarrocas del Drakensberg	<i>Chaetops aurantius</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Chaetopidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión del área de distribución post-reproducción con localizaciones tanto reproductoras como no reproductoras ocupadas de forma fiable cada estación; los individuos viajan normalmente menos de 100 km pero en una dirección no consistente; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Acrocephalidae	Carricero picudo	<i>Acrocephalus orinus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Acrocephalidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	DD

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Acrocephalidae	Carricerín manchú	<i>Acrocephalus tangorum</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Acrocephalidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Locustellidae	Yerbera japonesa	<i>Locustella pryeri</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Locustellidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Locustellidae	Buscarla de Pleske	<i>Locustella pleskei</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Locustellidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Locustellidae	Zarzalero piquilargo	<i>Locustella major</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Locustellidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen recorrer menos de 100 km pero en una dirección no uniforme; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Locustellidae	Yerbera estriada	<i>Chaetornis striata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Locustellidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambia de área de distribución después de la reproducción y es fuertemente nómada tanto en las temporadas de reproducción como en las de no reproducción; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Phylloscopidae	Mosquitero de Tytler	<i>Phylloscopus tytleri</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Phylloscopidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Phylloscopidae	Mosquitero de Ijima	<i>Phylloscopus ijimae</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Phylloscopidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Sylviidae	Curruca sudafricana	<i>Sylvia nigricapillus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Sylviidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: la contracción del área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente de 100 a 1.000 km, pero sin una dirección consistente; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Sylviidae	Curruca rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Sylviidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio de área de distribución después de la reproducción y expansión sustancial con lugares de reproducción ocupados de manera fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km pero sin una dirección consistente; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Pellorneidae	Prinia de Burnes	<i>Laticilla burnesii</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Pellorneidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión del área de distribución post-reproducción con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente menos de 100 km, pero en una dirección no consistente. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Turdidae	Zorzalito maculado	<i>Hylocichla mustelina</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Turdidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Turdidae	Zorzalito de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Turdidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Turdidae	Zorzal alirrojo	<i>Turdus iliacus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Turdidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migrante parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero son muy nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Turdidae	Zorzal de Fea	<i>Turdus feae</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Turdidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Muscicapidae	Papamoscas de Zappey	<i>Cyanoptila cumatilis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Muscicapidae	Papamoscas pechipardo	<i>Cyornis brunneatus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Muscicapidae	Alicorto ventrirrofo	<i>Brachypteryx hyperythra</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan normalmente menos de 100 km pero en una dirección no consistente; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Muscicapidae	Ruiseñor cabecirrojo	<i>Larvivora ruficeps</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: En Peligro; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero no se dispone de información sobre los movimientos no reproductores; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	EN
Muscicapidae	Ruiseñor de David	<i>Calliope pectardens</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Muscicapidae	Ruiseñor gorjinegro	<i>Calliope obscura</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero no se dispone de información sobre los movimientos no reproductores; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Muscicapidae	Papamoscas de Cachemira	<i>Ficedula subrubra</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Muscicapidae	Roquero centinela	<i>Monticola explorator</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión del área de distribución post-reproducción con lugares de reproducción ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos viajan normalmente menos de 100 km pero en una dirección no consistente; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Muscicapidae	Tarabilla de Stoliczka	<i>Saxicola macrorhynchus</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migrante completo y moderadamente nómada en la temporada de reproducción y fuertemente en la temporada de no reproducción; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km pero en una dirección no consistente. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Muscicapidae	Tarabilla de Hodgson	<i>Saxicola insignis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Muscicapidae	Colinegro sombrío	<i>Oenanthe dubia</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Muscicapidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Sedentarios/residentes: los lugares de reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada, pero moderadamente nómadas en la temporada de no reproducción; los individuos viajan normalmente de 100 a 1.000 km, pero en una dirección no uniforme. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	DD
Motacillidae	Bisbita pratense	<i>Anthus pratensis</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Motacillidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: cambio sustancial en el área de distribución después de la reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT
Motacillidae	Bisbita llanero	<i>Anthus spragueii</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Motacillidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Motacillidae	Bisbita montano	<i>Anthus hoeschi</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Motacillidae, anteriormente Muscicapidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen viajar más de 1.000 km de norte a sur. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT

Familia	Nombre común	Nombre científico	Notas para el Appendix II (Hojas 1 o 2)	2018 Categoría de la Lista Roja de la UICN
Motacillidae	Bisbita pechigualdo	<i>Hemimacronyx chloris</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Motacillidae, anteriormente Muscipidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Vulnerable; Movimientos caracterizados como: Migración parcial: expansión sustancial del área de distribución post-reproducción, con lugares de reproducción y no reproducción ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos viajan comúnmente de 100 a 1.000 km de este a oeste; al menos algunos movimientos son principalmente altitudinales. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	VU
Motacillidae	Lavandera del Mekong	<i>Motacilla samveasnae</i>	Un miembro de una familia desagregada del Apéndice II. (Motacillidae, anteriormente Muscipidae). Estado en la Lista Roja de la UICN: Casi Amenazado; Movimientos caracterizados como: Migración integral: tanto los lugares de reproducción como los de no reproducción están ocupados de forma fiable cada temporada; los individuos suelen recorrer menos de 100 km, pero en una dirección no uniforme. Cumple con los criterios de movimiento de la CMS.	NT