

**PROPUESTA PARA INCLUIR EN LOS APÉNDICES DE LA CONVENCION
SOBRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE
ANIMALES SILVESTRES (CMS)**

A. Propuesta: Incorporar *Polystictus pectoralis pectoralis* en el Apéndice II

B. Proponente: Gobierno de Paraguay

C. Fundamentación de la propuesta

1. Grupo taxonómico

1.1 Clase: Aves

1.2 Orden: Passeriformes

1.3 Familia: Emberizidae

1.4 Especie: *Polystictus pectoralis*

Subespecie: *pectoralis*

1.5 Nombres comunes: Tachuri, Tachurí canela, Bearded Tachuri

2. Datos biológicos

2.1 Distribución:

La especie tiene una distribución disjunta y muy localizada en los Andes de Colombia (subespecie *bogotensis*); el noreste de Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa y el extremo norte de Brasil (subespecie *brevipennis*); y en el este de Bolivia, sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina y Uruguay (subespecie *pectoralis*).

La subespecie *pectoralis* se conoce de la región central-sur de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sur de Goiás, Sao Paulo y Río Grande do Sul), pero en pocos sitios, y la mayoría de los registros son del invierno austral; la región Oriental y oeste-central de Paraguay (Boquerón, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Guairá, Central, Cordillera, Paraguari, Caazapá, Misiones y Itapúa; pero registrado de pocos sitios en los últimos años), norte de Argentina (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza); Uruguay (Artigas, Tacuarembó, Paysandú, Soriano, y Montevideo); y este de Bolivia (algunos especimenes antiguos de Santa Cruz).

2.2 Población

Es una especie escasa o rara y local, sin embargo en unos pocos sitios se ha reportado en números moderados. Se considera que la población esta en declinación, acercando a 20 % en los últimos 10 años. Las proyecciones de la pérdida de su hábitat sugieren que la declinación poblacional continuará en el futuro.

2.3 Hábitat

Habita diferentes tipos de pastizales, áreas con vegetación herbácea secundaria y pajonales y sabanas xeromórficas en las proximidades de esteros, bañados y cuerpos de agua. La presencia o la proximidad de algún cuerpo de agua parecería ser un factor importante.

2.4 Migraciones

En la región central-este de Argentina (Mendoza, La Pampa y Oeste de Buenos Aires) es un visitante austral estival. Más al norte, en Misiones, Argentina, y la región Oriental de Paraguay,

algunas poblaciones parecen ser residentes, mientras otras son migratorias. En Brasil, la mayoría de los registros son de la temporada de invernada.

3. Datos sobre amenazas

Se encuentra en la categoría casi amenazada de UICN debido a que se estima que la población ha sufrido una declinación marcada en los últimos años.

3.1 Amenaza directa a la población

Ninguna conocida

3.2 Destrucción del hábitat

La conversión del hábitat para agricultura (por eje. algodón para exportación), plantaciones de *Eucalyptus*, soja y la implantación de pasturas han producido un severo impacto del hábitat disponible en Brasil, donde, hasta 1993 dos tercios de los pastizales en su distribución habían sido alterados. Los pastizales de Paraguay y Argentina enfrentan las mismas amenazas, combinado con la ganadería extensiva, el pastoreo intensivo y las quemadas frecuentes.

3.3 Amenaza indirecta

3.4 Amenaza especialmente relacionada con las migraciones

La especie se encuentra amenazada por la conversión de su hábitat a lo largo de su área de distribución. En consecuencia, depende de acciones de conservación tanto en sus áreas de nidificación, como en las áreas que utiliza la especie durante su migración y la temporada de invernada.

3.5 Utilización nacional e internacional.

Ninguna conocida

4. Situación y necesidades en materia de protección

4.1 Situación de la protección nacional

En Brasil, la especie ha sido documentada en Parque Nacional Chapada dos Guimaraes, Parque Nacional das Emas, y la Estación Ecológica Itaipirina. En Paraguay se conoce la especie de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Refugio Biológico Tati Yupi y Área de Reserva para Parque Nacional San Rafael, y en Argentina en el Parque Nacional Mburucuyá, Parque Natural Costañero del Sur, Bañados del Río Dulce, Parque Natural Mar Chiquita y Reserva Nacional Científica Otamendi.

4.2 Situación de la protección internacional

Actualmente la especie no se encuentra listada en los apéndices de la CMS.

4.3 Necesidades de protección adicional

La especie se encuentra inadecuadamente representada en la red de áreas protegidas existente.

5. Estados del área de distribución

Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina.

6. Observaciones de los Estados del área de distribución

7. Otras observaciones

8. Referencias

BirdLife International (2000) *Threatened Birds of the World*. Barcelona & Cambridge, UK: Lynx Edicions and BirdLife International.

Collar N.J. & Wege, D.C. (1995) The distribution and conservation status of the Bearded Tachuri *Polystictus pectoralis*. *Bird Conservation International* 5: 367-390.