

ทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ในประเทศไทย

ลำดับที่	พื้นที่แรมซาร์ไซต์	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	ประกาศเมื่อวันที่	ข้อมูลทั่วไปและความสำคัญของพื้นที่
๙๔๘	พรุควนขี้เสียน	พัทลุง	๓,๐๘๗.๕	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๑	พื้นที่แรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มีลักษณะเป็นป่าพรุมีน้ำท่วมขัง ประกอบด้วยป่าพรุเสม็ดขาว ทุ่งหญ้าขึ้นที่ความอุดมสมบูรณ์สูงมาก มีความลึก ประมาณ ๐-๒ เมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทำรังวางไข่ของนกไม่ต่ำกว่า ๑๘๗ ชนิด ที่สำคัญได้แก่นกกาบบัว นกอ้ายงั่ว นกตะกรุม นกกระสานวล นกช้อนหอยขาว เหยี่ยวดำ นกฟินฟุต ฯลฯ
๑๐๙๘	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง	บึงกาฬ	๑๓,๘๓๗.๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓	เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะแคบยาว มีระบบนิเวศเชื่อมต่อกับแม่น้ำสงครามและแม่น้ำโขง มีความหลากหลายของพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๖๖ ชนิด ที่สำคัญ เช่น ปลาตุ๊กตาดัน ปลากุดเขียว ฯลฯ นกไม่ต่ำกว่า ๖๗ ชนิด ซึ่งอยู่ในสถานภาพถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ เช่น เป็ดดำหัวดำ เป็ดแดง นกกระแตหัวเทา ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลาน ๑๐ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอย่างน้อย ๖ ชนิด
๑๐๙๙	ดอนหอยหลอด	สมุทรสงคราม	๕๔๖,๘๗๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓	เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำและตะกอนน้ำทะเลบริเวณปากแม่น้ำกลองทำให้แผ่นดินขยายออกไปลงไปในทะเล ประมาณ ๘ กิโลเมตร เนื้อดินมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หายาก หาดเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด ( <i>Solen regularis</i> ) ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ และหอยอีกหลายชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในภูมิภาค รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนหลากหลายชนิด

ลำดับที่	พื้นที่แรมซาร์ไซต์	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	ประกาศเมื่อวันที่	ข้อมูลทั่วไปและความสำคัญของพื้นที่
๑๑๐๐	ปากแม่น้ำกระบี่	กระบี่	๑๓๓,๑๑๘.๗๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓	ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ที่เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ เขตผังเมืองรวมกระบี่ ป่าชายเลน หาดเลน หาดทราย และหญ้าทะเลผืนใหญ่ มีผืนป่าชายเลนที่มีสภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่หนาแน่น มีลำคลองหลายสายไหลลงสู่ทะเล มีความหลายของชนิดพันธุ์นกอย่างน้อย ๒๒๑ ชนิด ชนิดที่ใกล้สูญคุกคามระดับโลก เช่น นกยางจีน นกฟินฟุต นกทะเลขาเขียวลายจุด ฯลฯ พบพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๕๐ ชนิด รวมทั้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์
๑๑๐๑	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย	เชียงราย	๒,๗๑๒.๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓	เป็นบึงน้ำจืดขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกอพยพในช่วงฤดูหนาวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย พบชนิดนกอย่างน้อย ๑๒๑ ชนิด ชนิดที่สำคัญซึ่งถูกคุกคามระดับโลก ได้แก่ เป็ดดำหัวดำ ฯลฯ ชนิดที่หายาก เช่น เป็ดผีใหญ่ เป็ดใบกาล เป็นต้น รวมทั้งพบพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๒๑ ชนิด รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหมอแคะซึ่งพบเฉพาะในแหล่งน้ำจืดแถบภาคใต้ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงเท่านั้น
๑๑๐๒	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโตะแดง)	นราธิวาส	๑๒๕,๖๒๕	๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓	เป็นป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ยังคงเหลืออยู่ และมีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งรับน้ำจากลุ่มน้ำตอนบน มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง มีพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นอย่างน้อย ๕๐ ชนิด เช่น ช้างให้ กาบอ้อย ปาหนันช้าง ฯลฯ พบนกอย่างน้อย ๒๑๗ ชนิด ชนิดที่สำคัญและใกล้สูญพันธุ์เช่น นกตะกรุม นกฟินฟุต นกเป็ดน้ำใหญ่ นกเงือกดำ เขี้ยวปลาใหญ่หัวเทา ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลานอย่างน้อย ๕๒ ชนิด พันธุ์ปลาไม่ต่ำกว่า ๖๒ ชนิด
๑๑๘๒	หาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากแม่น้ำตรัง	ตรัง	๔๑๔,๔๕๖.๒๕	๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕	พื้นที่ประกอบด้วยระบบนิเวศ ๓ ลักษณะคือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และชายฝั่ง มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วย

ลำดับที่	พื้นที่แรมซาร์ไซต์	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	ประกาศเมื่อวันที่	ข้อมูลทั่วไปและความสำคัญของพื้นที่
					ป่าชายเลน แหล่งน้ำกร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกอย่างน้อย ๒๑๒ ชนิด ชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตกินปู ทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความงดงามทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่ง
๑๑๘๓	อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์	ระนอง	๗๖๒,๗๘๗.๕	๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕	เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดเหลืออยู่ของประเทศไทยและเขตอินโด-แปซิฟิก ประกอบด้วยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแบบที่ผสมผสานกันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนซึ่งพบต้นโกงกางขนาดใหญ่มีอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม ได้แก่ นกฟินฟุต นกหัวโตมลายูปลาเกะทุ่งเหวทะเล และนอกจากนี้ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำกระบุรี เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยระดับนานาชาติ เกี่ยวกับป่าชายเลน ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลลำดับที่ ๔ ของประเทศไทย และจัดว่าเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลประเภทป่าชายเลนแห่งแรกของโลก
๑๑๘๔	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง	สุราษฎร์ธานี	๖๓,๗๕๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕	ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ ๔๒ เกาะ ที่อยู่เป็นกลุ่มเกาะกลางทะเลอ่าวไทย วางเรียงตัวในแนวเหนือ ใต้ ส่วนใหญ่เป็นเขาหินปูนสูงชันซึ่งเป็นแนวหน้าผาสูงชันตั้งตั้งได้รับอิทธิพลของตะกอนจากแม่น้ำตาปี ลักษณะชายฝั่งมีความสูงชัน มีแนวปะการังก่อตัวเป็นแนวแคบๆ พบความหลากหลายของนกอย่างน้อย ๕๒ ชนิด ที่สำคัญได้แก่ นกเงือกดำ นกออก นกลุมพูขาว ฯลฯ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างน้อย ๑๖ ชนิด

ลำดับที่	พื้นที่แรมซาร์ไซต์	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	ประกาศเมื่อวันที่	ข้อมูลทั่วไปและความสำคัญของพื้นที่
๑๑๘๕	อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา	พังงา	๒๕๐,๐๐๐	๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕	เป็นอ่าวตื้นล้อมรอบด้วยป่าชายเลนต่อเนื่องเป็นผืนใหญ่ ระดับน้ำในอ่าวค่อนข้างตื้นประมาณ ๑-๔ เมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ ๔๒ เกาะ มีภูเขาหินตะกอน หินแปร แทรกสลับอยู่เป็นแนว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาหินปูนซึ่งแทรกโผล่เป็นหย่อมๆ กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวพังงาอย่างสวยงามที่มีชื่อเสียงได้แก่ เกาะปันหยี เกาะเขาพิงกัน เป็นต้น เป็นที่อยู่อาศัยของพะยูนซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน พบนกอย่างน้อย ๘๘ ชนิด ชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกหัวโตมลายู นกซ่อมทะเลอกแดง นกออก ฯลฯ พบพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๘๒ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ๑๘ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๑๗ ชนิด
๑๗๓๔	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	๔๓,๐๗๔	๑๔ มกราคม ๒๕๕๑	ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาสามร้อยยอด ตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตรมียอดเขาแหลมมากมาย มีกลุ่มเขาโดดตามแนวชายฝั่งทะเลและในทะเลเป็น ภูมิประเทศรอบเทือกเขาเป็นทุ่งที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งสามร้อยยอด” เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของเสือปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง พบความหลากหลายของพันธุ์พืชอย่างน้อย ๒๙๒ ชนิด สัตว์ป่า ๑๑๓ ชนิด และพันธุ์ปลาน้ำจืดอย่างน้อย ๔๑ ชนิด
๑๙๒๖	กุตทิง	บึงกาฬ	๑๓,๗๕๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒	มีลักษณะเป็นกุต (Oxbow lake) มีรูปร่างคล้ายกับปีกผีเสื้อ มีระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ระดับความลึกประมาณ ๒ - ๕ เมตร และในฤดูน้ำหลากอาจลึกถึง ๑๐ เมตร พบพืชอย่างน้อย ๖๐ ชนิด พันธุ์พืชอย่างน้อย ๑๕๐ ชนิด พบพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๑๑๓ ชนิด ที่เป็นชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นที่สำคัญ เช่น ปลาบู่กุตทิง เป็นต้น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ชนิด โดยเฉพาะนกอพยพในช่วงฤดูหนาวที่มีความสำคัญระดับโลก

ลำดับที่	พื้นที่แรมซาร์ไซต์	จังหวัด	พื้นที่ (ไร่)	ประกาศเมื่อวันที่	ข้อมูลทั่วไปและความสำคัญของพื้นที่
					เช่น เปิดคำหว่าด้า เปิดปากสัน เปิดเปียหน้าเขียว ฯลฯ
๒๑๕๒	เกาะกระ	นครศรีธรรมราช	๒,๓๓๗.๕	๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖	เป็นหมู่เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ประกอบไปด้วยภูเขาขนาดเล็ก แนวหินชายฝั่ง พบความหลากหลายของปะการังแข็งกว่า ๖๗ ชนิด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งปะการังที่หายากและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของเต่าตนุ และเต่ากระ เป็นแหล่งอาศัยของนกโจรสลัด เกาะคริสต์มาสซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
๒๑๕๓	หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง	พังงา	๑๒๒,๘๐๐	๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖	ประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่สองเกาะ มีความหลากหลายของระบบนิเวศที่เป็นทุ่งหญ้า ป่าชายเลน ป่าพรุ บึงน้ำจืด ป่าดิบชื้น ชายหาด หาดเลน หญ้าทะเล และแนวปะการังชายฝั่ง เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของเต่าหญ้า เต่ากระ และเต่ามะเฟือง เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญไม่กี่แห่งในประเทศไทยของนกตะกรุม ซึ่งเป็นนกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญ อาทิ ลิ่นชวา กวางป่า รวมทั้งพะยูน สัตว์ป่าสงวน อีกทั้งแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า ๔,๓๗๕ ไร่ ยังเป็นแหล่งขยายเพาะพันธุ์วางไข่ของพันธุ์ปลาไม่ต่ำกว่า ๒๖๘ ชนิด

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) จำนวน ๑๔ แห่ง พื้นที่รวมประมาณ ๒,๔๙๘,๒๑๑.๕ ไร่ หรือ ๓๙๙,๗๑๓.๘๔ เฮกแตร์ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

ที่มา: [www.ramsar.org\\_December](http://www.ramsar.org_December) 2016