

Pièce jointe 1

LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX APPARTENANT AUX FAMILLES ET GENRES ACTUELLEMENT REGROUPÉS SOUS L'ANNEXE II, RÉPONDANT AUX CRITÈRES DE LA CMS ET AYANT UN ÉTAT DE CONSERVATION DÉFAVORABLE

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Anatidae	Oie empereur	<i>Anser canagicus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Anatidae	Harelda kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Anatidae	Eider à lunettes	<i>Somateria fischeri</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Anatidae	Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel: L'aire de répartition après la reproduction change considérablement, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Anatidae	Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Anatidae	Macreuse à bec jaune	<i>Melanitta americana</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Anatidae	Harle de Chine	<i>Mergus squamatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN
Anatidae	Ouette de l'Orénoque	<i>Neochen jubata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction change, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction uniforme. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Anatidae	Nette à ailes blanches	<i>Asarcornis scutulata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Sédentaire/résident : lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement moins de 100 km, mais sans direction constante. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN
Anatidae	Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Anatidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : L'aire de répartition après la reproduction change considérablement, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Anatidae	Canard à lunettes	<i>Specularias specularis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion substantielle de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Anatidae	Canard à faucilles	<i>Mareca falcata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Anatidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Phoenicopteridae	Flamant du Chili	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Phoenicopteridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : les individus se déplacent après la reproduction et sont modérément nomades pendant les saisons de reproduction et hors de la période de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Phoenicopteridae	Flamant nain	<i>Phoeniconaias minor</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Phoenicopteridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Sédentaire/résident mais fortement nomade en saison de reproduction et hors saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km, mais pas dans la même direction. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Gruidae	Grue antigone	<i>Antigone antigone</i>	Membre d'un genre agrégé Antigone. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration après la reproduction change et les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction uniforme ; la sous-population australienne ne migre pas à travers les frontières internationales. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Gruidae	Grue blanche	<i>Grus americana</i>	Un membre d'un genre désagrégé Grus. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Pluvianellidae	Pluvianelle magellanique	<i>Pluvianellus socialis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Pluvianellidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion substantielle de l'aire de reproduction après la reproduction, les aires de reproduction étant occupées de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Haematopodidae	Huîtrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Haematopodidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Charadriidae	Pluvier des Andes	<i>Phegornis mitchellii</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction se déplace, les lieux de reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km nord-sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Charadriidae	Pluvier siffleur	<i>Charadrius melodus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Charadriidae	Pluvier de Swinhoe	<i>Charadrius dealbatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	DD
Charadriidae	Pluvier neigeux	<i>Charadrius nivosus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction : les lieux de reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km nord-sud ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Charadriidae	Pluvier élégant	<i>Charadrius pallidus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Charadriidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : Les individus se déplacent après la reproduction et sont modérément nomades pendant les saisons de reproduction et hors de la saison de reproduction ; ils parcourent généralement entre 100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Charadriidae	Pluvier montagnard	<i>Charadrius montanus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Charadriidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Charadriidae	Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Charadriidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction : les lieux de reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison mais sont modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Scolopacidae	Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Bécasseau à col roux	<i>Calidris ruficollis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Limnodrome semipalmé	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Scolopacidae	Bécassine de Strickland	<i>Gallinago stricklandii</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction est déplacée, les lieux de reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km nord-sud ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Scolopacidae	Bécassine des bois	<i>Gallinago nemoricola</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction se déplace, les lieux de reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km nord-sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Scolopacidae	Bécassine double	<i>Gallinago media</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Scolopacidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Scolopacidae	Chevalier de Sibérie	<i>Tringa brevipes</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Scolopacidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : Lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Sédentaire/résident : Les sites de reproduction et de non-reproduction sont occupés de façon fiable à chaque saison ; les immatures peuvent migrer au-delà de l'aire de répartition normale des adultes avant de retourner à la reproduction. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Aigle bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction se déplace, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Circaète de Beaudouin	<i>Circaetus beaudouini</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction : les lieux de reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement entre 100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Accipitridae	Circaète barré	<i>Circaetus fasciolatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement entre 100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Vautour de l'Himalaya	<i>Gyps himalayensis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : les individus se déplacent après la reproduction et connaissent une expansion substantielle et une expansion modérément nomade pendant les saisons de reproduction et hors de la période de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Vautour moine	<i>Aegypius monachus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction se déplace, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement entre 100 et 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

				2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	
Accipitridae	Aigle ravisseur	<i>Aquila rapax</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration se déplace après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement 100 à 1 000 km nord-sud ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Accipitridae	Busard maure	<i>Circus maurus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction : lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km nord-sud ; les irruptions dépassent parfois en nombre important l'aire normale ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN
Accipitridae	Busard pâle	<i>Circus macrourus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Accipitridae	Autour à ventre gris	<i>Accipiter poliogaster</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration se déplace après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Pygargue nain	<i>Icthyophaga humilis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Accipitridae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration se déplace après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km nord-sud ; les immatures peuvent migrer au-delà de l'aire normale des adultes avant de retourner se reproduire ; au moins une sous-population distincte du trajet de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Accipitridae	Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Accipitridae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration après la reproduction change et les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km mais sans direction uniforme ; au moins certains mouvements sont principalement altitudinaux ; les immatures peuvent migrer au-delà de leur aire normale avant leur retour à la reproduction. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Falconidae	Caracara austral	<i>Phalcoboenus australis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Falconidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de répartition après la reproduction change, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km nord-sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Falconidae	Faucon chicquera	<i>Falco chicquera</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Falconidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : les individus se déplacent après la reproduction et sont modérément nomades pendant les saisons de reproduction et hors de la période de reproduction ; ils parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction uniforme ; au moins une sous-population distincte de la voie de migration est considérée sédentaire. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Falconidae	Faucon concolore	<i>Falco concolor</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II de la CMS. (Falconidae). Bien qu'actuellement inscrite dans la base de données de l'Annexe II en tant qu'espèce, elle n'est pas officiellement inscrite. Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Oriolidae	Loriot argenté	<i>Oriolus mellianus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Oriolidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Vireonidae	Viréo à tête noire	<i>Vireo atricapilla</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Vireonidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Monarchidae	Tchitrec du Japon	<i>Terpsiphone atrocaudata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Monarchidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : L'aire de répartition après la reproduction change considérablement, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Chaetopidae	Chétopse doré	<i>Chaetops aurantius</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Chaetopidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Acrocephalidae	Rousserolle à grand bec	<i>Acrocephalus orinus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Acrocephalidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	DD

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Acrocephalidae	Rousserolle mandchoue	<i>Acrocephalus tangorum</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Acrocephalidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Locustellidae	Locustelle du Japon	<i>Locustella pryeri</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km, mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Locustellidae	Locustelle de Pleske	<i>Locustella pleskei</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Locustellidae	Locustelle à long bec	<i>Locustella major</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Locustellidae	Mégalure rayée	<i>Chaetornis striata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Locustellidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : Les individus se déplacent après la reproduction et sont fortement nomades pendant les saisons de reproduction et hors de la période de reproduction ; ils parcourent généralement de 100 à 1 000 km nord-sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Phylloscopidae	Pouillot de Tytler	<i>Phylloscopus tytleri</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Phylloscopidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Phylloscopidae	Pouillot d'Ijima	<i>Phylloscopus ijimae</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Phylloscopidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Sylviidae	Timalie à tête noire	<i>Sylvia nigricapillus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Sylviidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : contraction de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Sylviidae	Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Sylviidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement de l'aire de répartition après la reproduction et expansion substantielle, les lieux de reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Pellorneidae	Laticille de Burnes	<i>Laticilla burnesii</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Pellorneidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km, mais sans direction uniforme. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Turdidae	Grive des bois	<i>Hylocichla mustelina</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Turdidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Turdidae	Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Turdidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Turdidae	Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Turdidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction : les lieux de reproduction sont occupés de façon fiable chaque saison mais sont fortement nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Turdidae	Merle de Fea	<i>Turdus feae</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Turdidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Muscicapidae	Gobemouche de Zappey	<i>Cyanoptila cumatilis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Muscicapidae	Gobemouche à poitrine brune	<i>Cyornis brunneatus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Muscicapidae	Brachyptère à ventre roux	<i>Brachypteryx hyperythra</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : l'aire de migration se déplace après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km, mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Muscicapidae	Rosignol à tête rousse	<i>Larvivora ruficeps</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : En danger ; Mouvements caractérisés par : Migrateur intégrale : lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais aucune information sur les déplacements non reproducteurs ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	EN
Muscicapidae	Rosignol de David	<i>Calliope pectardens</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Muscicapidae	Rosignol à gorge noire	<i>Calliope obscura</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais aucune information sur les déplacements non reproducteurs ; les individus parcourent couramment plus de 1 000 km nord-sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Muscicapidae	Gobemouche du Cachemire	<i>Ficedula subrubra</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Muscicapidae	Merle de roche montagnard	<i>Monticola explorator</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion de l'aire de reproduction après la reproduction, les aires de reproduction étant occupées de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement moins de 100 km mais sans direction uniforme ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Muscicapidae	Tarier de Stoliczka	<i>Saxicola macrorhynchus</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale et modérément nomade pendant la saison de reproduction et fortement en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction constante. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Muscicapidae	Tarier de Hodgson	<i>Saxicola insignis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Muscicapidae	Traquet de roche sombre	<i>Oenanthe dubia</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Muscicapidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Sédentaire/résident : lieux de reproduction occupés de façon fiable chaque saison, mais modérément nomades en dehors de la saison de reproduction ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km, mais sans direction constante. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	DD
Motacillidae	Pipit des prés	<i>Anthus pratensis</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : déplacement important de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT
Motacillidae	Pipit de Sprague	<i>Anthus spragueii</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Motacillidae	Pipit du Drakensberg	<i>Anthus hoeschi</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement Muscicapidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement plus de 1 000 km du nord au sud. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT

Famille	Nom commun	Nom scientifique	Notes pour l'Annexe II (Feuilles 1 ou 2)	2018 Catégorie Liste Rouge de l'UICN
Motacillidae	Pipit à gorge jaune	<i>Hemimacronyx chloris</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Vulnérables ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur partiel : expansion substantielle de l'aire de répartition après la reproduction, les lieux de reproduction et les lieux de non-reproduction étant occupés de façon fiable chaque saison ; les individus parcourent généralement de 100 à 1 000 km d'est en ouest ; au moins certains déplacements sont principalement altitudinaux. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	VU
Motacillidae	Bergeronnette du Mékong	<i>Motacilla samveasnae</i>	Un membre d'une famille désagrégée de l'Annexe II. (Motacillidae, anciennement Muscipidae). Statut de la Liste Rouge de l'UICN : Quasi menacés ; Mouvements caractérisés comme : Migrateur intégrale : lieux de reproduction et de non-reproduction occupés de façon fiable à chaque saison ; les individus parcourent généralement moins de 100 km, mais sans direction constante. Répond aux critères de mouvement de la CMS.	NT